

Frédéric BONNIN

Attitudes de l'orthodontiste face aux dents traumatisées

Orthodontist's approach facing traumatized teeth

Résumé : La prévalence des traumatismes alvéolo-dentaires (TAD) reste conséquente au sein de la population orthodontique jeune, de l'ordre de 15 à 30% selon les études. De la simple contusion à la luxation complète, ces TAD représentent au mieux une simple contrariété pour l'orthodontiste mais peuvent l'amener à contraindre ses choix thérapeutiques lorsque les dents concernées s'avèrent plus lourdement atteintes voire condamnées. L'orthodontiste est aussi amené à jouer un rôle crucial dans la prise en charge immédiate et pluridisciplinaire des TAD.

La variété des TAD associée à la diversité des dysmorphoses multiplie à l'infini les tableaux cliniques ce qui doit conduire le praticien à suivre des *guidelines* afin d'élaborer la meilleure stratégie.

Il convient d'illustrer à travers de nombreux cas cliniques les spécificités de cette prise en charge, qu'elle soit immédiate ou différée dans le temps.

Abstract: The prevalence of dentoalveolar trauma (DAT) remains significant among the young orthodontic population, ranging from 15% to 30% according to studies.

From a simple contusion to complete expulsion, these injuries may represent at best a minor inconvenience for the orthodontist, but can also constrain treatment choices when the affected teeth are more severely damaged or even deemed non-restorable. The orthodontist is also called upon to play a crucial role in the immediate and multidisciplinary management of such trauma.

The wide variety of DAT, combined with the diversity of dento-facial deformities, creates an almost infinite range of clinical situations, which should lead the practitioner to follow established guidelines in order to develop the most appropriate treatment strategy.

Numerous clinical cases should be used to illustrate the specific features of this management, whether performed immediately or at a later stage.